



Opdateret 1-1-2022

HSU

HSU står for *Hystero Salpingo Ultrasonografi / Hystero Sonografisk Undersøgelse*. Dette er en undersøgelse af passageforholdene i æggelejerne ved hjælp af ultralydskanning.

For at opnå graviditet ved naturmetoden samt ved inseminationsbehandling, er det en betingelse, at der er passage gennem mindst én af æggelejerne.

Æggelejerne kan være aflukkede som følge af en underlivsbetændelse. Ofte har kvinden ikke været opmærksom på, at der har været en underlivsbetændelse, idet der forekommer "stumme" underlivsbetændelser, d.v.s. uden samtidige smerter og feber. Dette kan f.eks. forårsages af mikroorganismen Chlamydia.

Undersøgelsen foretages i perioden efter menstruationen er ophørt og inden forventet ægløsningstidspunkt, altså typisk mellem 8 og 12 cyklusdag. Du skal derfor ringe og bestille tid lige så snart du får din menstruation.

Fremgangsmåde.

Et lille latexkateter føres op gennem livmoderhalsen til livmoderhulen. For enden af kateteret er der en lille ballon der fyldes med steril saltvand efter kateteret er lagt op i livmoderen. Denne ballon lukker livmoderen af forneden, så den væske der nu sprøjtes op igennem kateteret ikke kan løbe ud i skeden, men i stedet løber ud i æggelejerne.

Ved at skanne imens væsken bliver sprøjtet ind, kan lægen se om der er passage i æggelejerne. Den væske der bruges er et lokalbedøvende stof, (Xylocain)

Hvis der ikke er nogen passage gennem æggelejerne eller der er tvivl om dette, kan der overvejes en anden undersøgelse, f.eks en HSG

En HSG, foregår enten på hospitalet eller på en røntgen klinik, En HSG har samme fremgangsmetode som HSU, men der bliver brugt røntgen og kontrastvæske i stedet for Ultralyd og lidocain. En laparoskopi (kikkertundersøgelse) på hospitalet kan også komme på tale.

Bivirkninger og smerter.

Det gør sjældent ondt at få foretaget en HSU, men enkelte kan opleve at de bliver lidt utilpasse af Xylocain. Xylocain kan give utilpashed og/eller svimmelhed. Af samme grund er det bedst, at du ikke selv kører hjem efter undersøgelsen.

Efter undersøgelsen

Ingen sygemelding. Der kan være ømhed i underlivet i nogle timer efter undersøgelsen. Det kan behandles effektivt med to tabletter Panodil og 400 mg ibuprofen Der kan være aftagende pletblødninger i nogle dage pga. blødninger fra slimhinden som bliver irriteret af kameraet. Der kan være risiko for underlivsinfektion, hvilket kan give et af følgende symptomer: vedvarende kraftige smerter, blødninger, ildelugtende udflåd, feber. Såfremt det er tilfældet skal du kontakte os i vores åbningstider eller skadestuen hvis du ikke kan komme i kontakt med os. Hvis lægen har taget prøverne fra under undersøgelsen får du et mikroskopisvar en til to uger efter det.

Gynækologisk Klinik i Hvidovre ved Tri Huu Nguyen, speciallæge i gynækologi og obstetrik, ph.
Gl. Køge Landevej 272, 2650 Hvidovre.

